


ACTIPOST 360

NOWOŚĆ

AKTYWATOR KOMPOSTOWANIA

dla wszystkich
typów
nawozów
odzwierzęcych



poprawa jakości
obornika i gnojowicy



ODŻYWIANIE ZWIERZĄT

pl.timacagro.com

ACTIPOST 360

Problemy w składowaniu obornika i gnojowicy?



Tworzenie się kożucha na powierzchni gnojowicy
Występowanie osadu na dnie zbiornika



Straty składników odżywczych
(wyciekanie, utlenianie)



Utrudniona mineralizacja
Niski rozkład materii w oborniku



Trudności w składowaniu i transporcie



Uciążliwy zapach
Rozprzestrzenianie się patogenów

Rozwiązanie: ACTIPOST 360



OCHRONA SKŁADNIKÓW NAWOZOWYCH: N, P, K, S

POŁĄCZENIE NATURALNYCH GLINEK:

- Wysoka zdolność zatrzymania wody
- Absorpcja N, P, K = gąbka mineralna



AKTYWATOR KOMPOSTOWANIA

DZIAŁANIE MIKROORGANIZMÓW, ENZYMÓW, ALG BRUNATNYCH I WAPNIA POCHODZENIA MORSKIEGO:

- Wsparcie rozwoju korzystnych bakterii i grzybów
- Stosunek C/N korzystniejszy dla mineralizacji nawozów organicznych
- Homogenizacja struktury ułatwiająca wykorzystanie gnojowicy



WIĄZANIE AZOTU I KONTROLA GAZÓW

POŁĄCZENIE NATURALNYCH GLINEK I MIKROORGANIZMÓW:

- Wiązanie azotu
- Niższa emisja amoniaku (NH_3) i metanu (CH_4)




SANITYZACJA


DZIAŁANIE MIKROORGANIZMÓW I ALG BRUNATNYCH:

- Szybszy wzrost temperatury masy organicznej
- Zahamowanie kiełkowania nasion chwastów
- Lepsza kontrola patogennych mikroorganizmów


Całkowita zawartość P, K, S w oborniku po 9 tygodniach od zastosowania ACTIPOST 360



Całkowita zawartość N w oborniku po 9 tygodniach



Zmiany w zbiorniku na gnojowicę po 35 dniach od zastosowania Actipost 360



Porównanie wzrostu temperatury w czasie



Instrukcja użycia:

PRZEŻUWACZE:

Obornik: Rozsypać na obornik w ilości 1 kg/m³ bezpośrednio przed czyszczeniem.

Gnojowica: Wsypać bezpośrednio w kanały gnojowe w ilości 1 kg/m³ gnojowicy, następnie: 1 raz w tygodniu w ilości 300 g/m³ lub 1,5 kg/m³ na miesiąc – na korytarzach ze zgarniaczem lub w kanały gnojowe.

DRÓB:

Obornik: Rozsypać na obornik w ilości 1 kg/m³ bezpośrednio przed czyszczeniem.

Gnojowica: Wsypać do zbiornika na gnojowicę w ilości: 1 kg/m³ gnojowicy, a następnie aplikować w dawce 60 g/m³ co tydzień.

TZRODA CHLEWNA:

Obornik: Rozsypać na obornik w ilości 1 kg/m³ bezpośrednio przed czyszczeniem.

Gnojowica: Wsypać bezpośrednio w kanały gnojowe w ilości:

Kojce porodowe: 1 kg/m³ podzielony na kilka dawek.
Kojce odsadzeniowe: rozsypać 300 g/prosię przed wstawieniem zwierząt.

Tucze: dawka początkowa 500 g/sztukę, następnie 200 g/sztukę dwukrotnie podczas tuczu.



pl.timacagro.com

 **Timac AGRO**